

## **Dubbel bypass vs stentstrategi vid intraoperativt funnen irresektabel periampullär cancer**

**Typ/Design:** Randomiserad fall/kontroll

**Undersökta behandlingar:** Dubbel Bypass (Hepaticojejunostomi + Gastroenteroanastomos) jämförs mot stentstrategi hos patienter där man vid planerad Whippleoperation gör fynd peroperativt som omöjliggör radikal kirurgi.

**Primär utfallsvariabel:** Procedurrelaterad morbiditet

**Sekundära utfallsvariabler:** Reinterventioner, vård dagar, vårdkostnader samt QoL

**Lämpliga patienter/Målgrupp:** Samtliga som planeras för Whippleoperation på grund av cancer kommer att tillfrågas om deltagande i studien. Endast en mindre del av hela denna grupp har en så avancerad sjukdom att den planerade operationen inte kan genomföras. Då detta inte står klart förrän under operationen måste alla patienter informeras och lämna eventuellt samtycke i förväg men den egentliga inklusionen och randomiseringen sker under operationen.

**Ingående Centra:** Kirurgkliniken Universitetssjukhuset i Linköping, Kirurgkliniken Skånes Universitetssjukhus, Lund, Gastrocentrum Kirurgi Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Kirurgcentrum vid Norrlands Universitetssjukhus Umeå, Kirurgkliniken Universitetssjukhuset Örebro samt Verksamhet för Kirurgi SU/Sahlgrenska Göteborg.

**Antal patienter:** 80

**Status/Start:** (01-07-11) Inklusion pågår

**Inkluderade patienter:** (01-07-11) 0 patienter

**Kontaktperson:** Claes Jönson, [claes.jonson@vgregion.se](mailto:claes.jonson@vgregion.se)