

## **Sluta slitsar efter lap-GBP?**

**Typ/Design:** Randomiserad fall/kontroll studie

**Primär utfallsvariabel:** Operation för symtomgivande ileus

**Sekundära utfallsvariabler:** Tidiga och sena kirurgiska komplikationer

**Lämpliga patienter/Målgrupp:** Patienter med obesitas genomgående laparoskopisk GBP

**Ingående Centra:** Kirurgiska klinikerna vid sjukhusen i: Örebro/Lindesberg; Ersta (Stockholm), Sopiahemmet (Stockholm); Torsby; Skövde; Lund/Landskrona; Blekinge/Karlshamn; Lycksele; Norrtälje; Sahlgrenska (Göteborg); Danderyd

**Antal patienter:** 2 400 (1 200 per grupp)

**Status/Planerad start** (2010-05-01): Inklusion pågår

**Inkluderade patienter** (2011-02-28): 1 191

**Kontaktperson:** Erik Stenberg [erik.stenberg@orebroll.se](mailto:erik.stenberg@orebroll.se), Ingmar Näslund [ingmar.naslund@orebroll.se](mailto:ingmar.naslund@orebroll.se)

**Övrig info:** SOReg används för att administrera studien. Som dubbelkoll maila information om ileus (slitsileus och annan genes) på alla patienter som opererats vid något av ingående centra efter maj 2010 till [slitsileus@orebroll.se](mailto:slitsileus@orebroll.se)